

Sífilis Congénita (Sífilis de madre a hijo)



1. ¿Qué es la sífilis congénita?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias (gérmenes). La sífilis es fácil de curar. Sin tratamiento, puede hacerle daño a los órganos de su cuerpo. La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. Puede causar que mujeres tengan a su bebé demasiado temprano o un aborto espontáneo o el bebé nacido muerto. También puede causar defectos de nacimiento graves en los bebés.

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad?

Usted puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. Puede que no pueda ver las llagas y no causan dolor. La sífilis congénita se propaga de una madre infectada a su bebé durante el embarazo o durante el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

A menudo las personas no presentan síntomas, por lo que ellos no saben que están infectadas. Señales de la sífilis pueden incluir una llaga cerca del área donde el germen entro a el cuerpo (vagina, ano, labios o boca) o salpullido en una o más áreas del cuerpo. La única manera de saber con seguridad es hacerse una prueba. Una prueba de detección de la sífilis es parte del cuidado prenatal (atención médica durante el embarazo).

4. ¿Cómo debo hacerme la prueba?

Las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba para la sífilis durante su primera visita prenatal. Algunas mujeres también deben hacerse la prueba una vez más, más adelante en el embarazo. Asegúrese de obtener los resultados de su prueba para la sífilis y siga el consejo médico de su médico.

5. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad?

La sífilis puede ser tratada y curada, incluso durante el embarazo, con una inyección de antibióticos (medicamento que mata los gérmenes). Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) se hagan una prueba y reciban tratamiento también. Esto les ayudará a mantenerse saludable y evitar contagiar a otras personas, y evitar infectarse de nuevo.

6. ¿Cómo se previene esta enfermedad?

- Use condones
- Vaya a sus visitas prenatales para las pruebas y el tratamiento lo antes posible. Si no tiene un médico, llame gratis al teléfono de asistencia para ETS (800) 758-0880 para encontrar dónde puede hacerse un análisis y recibir tratamiento gratis.

Puntos clave:

- La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada pasa la sífilis a su bebé durante embarazo o parto.
- Los síntomas comunes de la sífilis incluyen una llaga o salpullido, pero muchas personas no ven señales de la enfermedad.
- La sífilis es tratada y curada con antibióticos.
- El cuidado prenatal es muy importante para detectar y tratar la sífilis.

Para más información:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés)

<http://www.cdc.gov/std/pregnancy/stdfact-pregnancy.htm>

<http://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm>

Oficina de la Salud de la Mujer de los EE.UU.

<https://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/syphilis.html>

DHSP-STD-0023-02 9/08/15)